Patogênese: Teorias:
 - alterações histopatológicas
 - alterações de neurotransmissores
 - fatores genéticos (risco de 8 vezes de desenvolvimento)
 - fatores ambientais comportamentais

Fisiopatologia:
 Distúrbio do processamento central da dor

Manifestações clínicas:
 - Dor musculoesquelética crônica (superior a 3 meses) generalizada
 - Fadiga
 - Distúrbios do sono
 - Cefaleia
 - Parestesia

Doenças associadas:
 - Síndrome do cólon irritável: 50 a 80% dos casos
 - Alterações do humor (depressão ou ansiedade): 25 a 60% dos casos
 - Enxaqueca: 50% dos casos

Diagnóstico diferencial

- sono recorrente e intermitente
 - perda de memória e concentração
 - dor de cabeça
 - exaustão duradoura

Síndrome de fadiga crônica

Tratamento:
 - programa de exercícios
 - terapia cognitivo-comportamental

- dor assimétrica em pontos específicos
 - comum em ambos os sexos
 - qualquer idade
 - presença de encurtamento muscular

Síndrome miofascial

Tratamento:
 - aplicação tópica de calor e frio
 - técnicas de alongamento
 - educação postural
 - relaxantes musculares
 - infiltração de pontos gatilhos

Exame físico:
 - ausência de sinal de sinovite
 - ausência de sinal de tendinite
 - força muscular preservada
 - reflexos osteotendíneos normais
 - presença de tender points: pontos dolorosos sensíveis a digitopressão
 - presença de nódulos musculares

Exames complementares: considerar solicitar para exclusão diagnóstica
 - hemograma: ausência de anemia de doença crônica
 - VHS: normal
 - FR: normal
 - FAN: normal
 - TSH e T4L: normal
 - ENM: normal

Diagnóstico diferencial:
 - LES
 - AR
 - Polimialgia reumática
 - Hipotireoidismo
 - Polimiosite e Dermatomiosite
 - Síndrome de Sjogren
 - Miopatia medicamentosa
 - Miopatia metabólica
 - EM
 - Distúrbio hidroeletrolítico
 - Hiperparatireoidismo
 - Osteomalácia
 - Insuficiência adrenal
 - Neoplasias
 - Síndrome de hipermotilidade
 - Doença de Lyme
 - Mieloma múltiplo

Critérios Diagnóstico: ACR 2010
 - Escala da gravidade dos sintomas (ESS) >= 5 + Índice de dor generalizada (IDG) >= 7 ou
 Escala de gravidade dos sintomas (ESS) >= 9 + Índice de dor generalizada (IDG) 3-6
 - Presença dos sintomas há pelo menos 3 meses
 - Ausência de outra doença que possa explicar o quadro

Fibromialgia

Epidemiologia:
 - Prevalência: 2 a 3%
 - Predominância: sexo feminino, 35 a 55 anos

Tratamento

Não medicamentoso:
 - Explicar ao paciente sobre a doença
 - Treino postural e de consciência corporal
 - Atividades físicas aeróbicas: hidroginástica, caminhada, Tai Chi
 - Terapia cognitivo-comportamental
 - Técnicas de relaxamento

Medicamentoso

Dor + insônia: Preferir droga de efeito analgésico e facilitador do sono:
 - Amitriptilina
 - Gabapentina
 - Pregabalina

Dor + depressão / ansiedade: Preferir droga de efeito analgésico e antidepressivo:
 - Duloxetina
 - Milcipram

Associar, segundo necessidade:
 - Ciclobenzaprina
 - Paracetamol ou Dipirona

Associar, segundo necessidade:
 - Ciclobenzaprina
 - Paracetamol ou Dipirona